PENGARUH PENAMBAHAN KONSENTRASI JUS JAMBU BIJI MERAH (*Psidium guajava* L.) TERHADAP KADAR ASAM LAKTAT, VITAMIN C, DAN AKSEPTABILITAS SET YOGURT

THE EFFECT OF ADDITION OF RED GUAVA (*Psidium guajava* L.) JUICE CONCENTRATION ON LACTIC ACID LEVELS, VITAMIN C, AND ACCEPTABILITY OF SET YOGURT

Received : Oct 9th, 2019
Accepted : Nov 19th, 2019

Muhamad Raihan Aufa^{*1},
Wendry Setiyadi Putranto²,
Roostita L Balia²

¹Alumni Fakultas
Peternakan,
Universitas Padjadjaran.
²Departemen Teknologi
Hasil Peternakan, Fakultas
Peternakan Universitas
Padjadjaran.

*Muhamad Raihan Aufa:

Fakultas Peternakan
Universitas Padjadjaran.

Jalan Raya Bandung-
Sumedang KM 21
Jatinangor, Sumedang.
45363.

e-mail:
mrai.aufa@gmail.com

Abstract. Red guava has high level of vitamin C, so it can be used as a source of vitamin C, also has a distinctive color. This study aims to determine the effect with different concentration of guava juice on lactic acid levels, vitamin C and acceptability of cow milk yogurt set. The experimental method used Completely Randomized Design (CRD) with four treatments increasing the concentration of red guava juice (0%, 5%, 10%, and 15%) and each treatment repeated five times. The results showed that the addition of the concentration of red guava juice by 0% to 15%, the lactic acid levels of different cow's milk set yogurts showed a negative linear regression pattern with the regression $y = -0,03724x + 1,10465$ $R^2 = 0,99699$, and increasing vitamin C levels following a positive linear regression pattern $y = 1,2932x - 0,324$ $R^2 = 0,9452$. The concentration of red guava juice 15% produced the best cow's milk set yogurt with 0,55% lactic acid levels and 20,69 mg/100 g vitamin C levels produces and produced the most preferred acceptability value with hedonic scale likes and numeric scales 2,20.

Keywords: guava juice concentration, lactic acid, acceptability, vitamin C levels.

Sitasi:

Aufa, M. R., Putranto, W. S., & Balia, R. L. (2020). Pengaruh Penambahan Konsentrasi Jus Jambu Biji Merah (*Psidium guajava* L.) terhadap Kadar Asam Laktat, Vitamin C, dan Akseptabilitas Set Yogurt. *Jurnal Teknologi Hasil Peternakan*, 1(1):8-16.

PENDAHULUAN

Susu sapi merupakan salah satu bahan pangan dengan kandungan zat gizi yang baik bagi kesehatan manusia. Namun berdasarkan data, tingkat konsumsi susu dan produk olahannya di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya,

yaitu hanya 11,8 liter/kapita/tahun (Agustina, 2016). Hal ini mendorong berbagai industri pangan untuk menyediakan aneka ragam produk olahan pangan susu dengan macam varian bentuk maupun rasa yang diminati oleh masyarakat.

Salah satu bentuk olahan pangan dari susu yang umum di

masyarakat adalah yogurt. Yogurt merupakan salah satu bentuk produk olahan susu dari hasil fermentasi menggunakan starter bakteri asam laktat. Berdasarkan metode pembuatan dan struktur fisik koagulumnya, yogurt dibagi menjadi dua kategori yaitu, *set* yogurt dan *stirred* yogurt. Berbeda dengan *stirred* yogurt, pada proses pembuatan *set* yogurt, tahapan inokulasi starter atau fermentasi susu dilakukan di dalam kemasan siap saji dan karakteristik koagulumnya tidak berubah. Biakan bakteri starter dalam proses pembuatan yogurt memegang peranan penting terhadap produk akhir yang akan dihasilkan.

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai manfaat produk *set* yogurt, pada penelitian ini ditambahkan bakteri probiotik yang memiliki efek manfaat kesehatan khususnya dalam saluran pencernaan manusia yaitu *Lactobacillus acidophilus*. Bakteri ini memiliki keistimewaan memproduksi zat anti mikroba yang akan menstimulasi kekebalan tubuh serta mampu menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Lourens-Hattingh & Viljoen, 2001). Bakteri *Streptococcus thermophilus*, *Lactobacillus bulgaricus* dan *Lactobacillus acidophilus* sebagai starter akan hidup dan saling berstimulasi satu sama lainnya sehingga pertumbuhan bakteri starter akan lebih cepat dalam proses fermentasi. Selama proses fermentasi, bakteri starter akan merombak laktosa pada susu menjadi asam laktat, asam-asam organik, dan juga membentuk komponen rasa yang akan menurunkan pH sehingga produk menjadi kental hingga padat, serta memiliki bau dan rasa yogurt yang khas.

Upaya dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap produk *set* yogurt, yaitu dengan melakukan modifikasi rasa dan tampilan warna dengan pemberian bahan tambahan

lain. Salah satu bahan alami yang dapat digunakan adalah jus dari buah jambu biji merah (*Psidium guajava* L.), karena memiliki cita rasa khas yang diminati konsumen. Selain cita rasa, tingginya kandungan pigmen likopen pada daging buah jambu biji, mampu memberikan warna merah alami dan diharapkan dapat meningkatkan nilai kesukaan atau akseptabilitas masyarakat terhadap produk *set* yogurt.

Keunggulan lain dalam jus jambu biji adalah tingginya kandungan vitamin C yang merupakan antioksidan alami yang banyak terdapat pada daging buah jambu biji merah yang sudah matang. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit terkait keberadaan radikal bebas apabila rutin dikonsumsi.

Selain kandungan nutrisi, tingkat penerimaan konsumen menjadi aspek yang sangat penting. Faktor-faktor terkait dalam penerimaan konsumen yaitu penampakan, bau, warna dan rasa. Produk *set* yogurt dengan penambahan jus jambu biji merah diharapkan memiliki penampakan yang kental hingga padat, bau khas yogurt, warna merah muda yang menarik bagi konsumen, serta rasa asam khas yogurt dan rasa manis dari jambu biji merah. Hingga saat ini, masih belum banyak produk *set* yogurt dengan penggunaan pewarna dan perisa alami yang murni terbuat dari jus buah. Minimnya pengetahuan masyarakat akan manfaat keunggulan produk olahan *set* yogurt dengan penambahan jus jambu biji merah, menjadi dasar pemikiran yang menarik bagi penulis. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penambahan jus jambu biji merah (*Psidium guajava* L.) terhadap kadar asam laktat, kadar

vitamin C, dan akseptabilitas *set* yogurt susu sapi.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahapan, yaitu 1) Persiapan Jus Jambu Biji Merah, dan 2) Pembuatan *Set* Yogurt dengan Penambahan Jus Jambu Biji Merah.

- a. Persiapan Jus Jambu Biji Merah (Modifikasi Chairunnisa, 2011).

Persiapan jus jambu biji merah diawali dengan sortasi buah yang sudah matang. Jambu biji dibersihkan kemudian dikupas dan diiris untuk memperkecil ukuran. Kemudian diekstraksi menggunakan *juice extractor* dan disaring. Jus jambu biji merah kemudian dipanaskan hingga mencapai suhu 70°C selama 15 menit dan dinginkan hingga suhu 42°C dengan bantuan air mengalir.

- b. Pembuatan *Set* Yogurt dengan Penambahan Jus Jambu Biji Merah (Modifikasi Lyo-San Inc, 2015; Patil *et al.*, 2009).

Pembuatan *set* yogurt diawali dengan melarutkan 10% susu skim bubuk (b/v), 0,7 % CMC (b/v) dan 7% gula pasir (b/v) ke dalam susu sapi segar untuk mencapai bahan kering 20% (Chairunnisa *et al.*, 2017). Kemudian dipanaskan pada suhu 90-95°C selama 30 menit, dan dinginkan sampai suhu 42°C. Tambahkan *bulk culture* 5% (v/v) serta jus jambu biji merah sesuai dengan perlakuan yaitu, (tanpa penggunaan jus jambu), (5%), (10%) dan (15%) (b/v).

Unit percobaan untuk uji kadar asam laktat dan vitamin C menggunakan 100 ml susu sapi dan untuk uji akseptabilitas menggunakan 60 ml. Selanjutnya, setiap unit percobaan ditutup rapat mengguna-

kan plastik kedap udara dan diinkubasi pada suhu 42°C selama 6 jam (sesuai hasil penelitian pendahuluan), hingga terbentuk gumpalan sempurna tanpa sineresis. *Set* yogurt jambu biji merah yang terbentuk kemudian dilakukan analisis kadar asam laktat dan kadar vitamin C, dan sebagian disimpan dalam refrigerator dengan suhu 4°C selama 12 jam untuk pengujian akseptabilitas.

- c. Rancangan Percobaan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari empat perlakuan penambahan persentase jus buah jambu biji merah yang berbeda (P0, P1, P2 dan P3) dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak lima kali dilanjutkan dengan menggunakan uji Tukey taraf 0,05%. Akseptabilitas diuji dengan uji Kruskal-Wallis, apabila menunjukkan hasil yang berbeda maka dilakukan uji Mann-Whitney untuk menguji perbedaan rata-rata antar perlakuan. Peubah yang diamati meliputi; 1) Kadar Asam Laktat (BSNI, 2009); 2) Kadar Vitamin C (Khasanah *et al.*, 2015); 3) Uji Akseptabilitas (Setyaningsih *et al.*, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Kadar Asam Laktat.

Berdasarkan data pada Tabel 1, semakin tinggi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah, maka kadar asam laktat semakin rendah. Kadar asam laktat berdasarkan uji Tukey taraf 0,05% menghasilkan nilai yang berpengaruh nyata berturut-turut terhadap semua perlakuan.

Hasil sidik ragam Polynomial Orthogonal menunjukkan bahwa pengaruh penambahan seluruh perlakuan konsentrasi jus jambu biji merah terhadap kadar asam laktat berbeda nyata ($P < 0,05$), dengan mengikuti pola persamaan regresi linier

negatif. Penambahan jus jambu biji merah sebesar 5%, 10% dan 15% nyata menurunkan kadar asam laktat *set* yogurt susu sapi. Kadar asam laktat *set* yogurt susu sapi memiliki pola garis linier dengan persamaan $y = -0,03724x + 1,10465$ ($R^2 = 0,99699$).

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,99699 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi jus jambu biji merah dalam mempengaruhi kadar asam laktat pada *set* yogurt susu sapi sebesar 99%. Hal ini menyatakan konsentrasi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah 0% hingga 15% berpengaruh nyata terhadap kadar asam laktat. Menurut Syarat Mutu Yogurt SNI 2981:2009, kadar asam laktat yogurt cenderung normal yaitu dalam kisaran 0,5-2,0%.

Penurunan nilai rata-rata kadar asam laktat pada grafik di atas dikarenakan semakin tinggi konsentrasi penambahan jus jambu biji merah menyebabkan karbon (gula) yang tersedia dalam media pertumbuhan menjadi tinggi, selain itu pada pembuatan *set* yogurt susu sapi ini ditambahkan gula sebesar 7% untuk memberikan kesan manis sehingga, menyebabkan fermentasi menjadi terhambat. Yusmarini & Effendi (2004), menyatakan penambahan beberapa jenis karbohidrat dalam pembuatan yogurt yaitu laktosa, sukrosa dan glukosa sebagai sumber karbon, memberikan pengaruh terhadap pH, kandungan asam laktat dan kandu-

ngan protein. Lebih lanjut, menurut Gianti & Evanuarini (2011), semakin tinggi kadar gula pada susu fermentasi cenderung dapat mempengaruhi pH dan menyebabkan penurunan aktivitas *starter*. Hal ini dikarenakan konsentrasi medium yang pekat menyebabkan mikroorganisme mengalami osmosis dan pertumbuhannya terhambat, sehingga pembentukan asam laktat semakin menurun. Selain itu, gula yang ditambahkan ke dalam bahan pangan dengan konsentrasi tinggi menyebabkan sebagian besar air berkurang sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air untuk mikroorganisme (Abdul *et al.*, 2018). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rahman *et al.* (1992), bahwa pada konsentrasi gula lebih dari 5,5% maka aktivitas kultur akan mengalami penghambatan.

b. Kadar Vitamin C.

Tabel 1. menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah, maka kadar vitamin C semakin tinggi. Kadar vitamin C berdasarkan uji Tukey taraf 0,05%. Penambahan konsentrasi jus jambu biji merah 5% (P1) dengan 10% (P2) nyata tidak berbeda, namun nyata berbeda dengan perlakuan 0% (P0) dan 15% (P3). Penambahan konsentrasi 15% (P3) nyata lebih tinggi dibandingkan 10% (P2), 5% (P1), dan 0% (P0).

Tabel 1. Total Asam Laktat dan Total Vitamin C dengan Berbagai Perlakuan

Peubah	Perlakuan			
	P0	P1	P2	P3
Kadar Asam Laktat (%)	1,10 ^a	0,94 ^b	0,72 ^c	0,55 ^d
Vitamin C (%)	0,00 ^a	7,11 ^b	9,70 ^b	20,69 ^c

Keterangan: Huruf yang berbeda ke arah baris pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata.

Gambar 1. Grafik *Polynomial Orthogonal* Pengaruh Penambahan Jus Jambu Biji Merah terhadap Kadar Asam Laktat Set Yogurt Susu Sapi.

Hasil sidik ragam *Polynomial Orthogonal* menunjukkan bahwa pengaruh penambahan konsentrasi jus jambu biji merah konsentrasi 0% (P0), 5% (P1), 10% (P2), dan 15% (P3) kadar vitamin C berbeda nyata ($P < 0,05$) dengan mengikuti pola persamaan regresi linier positif. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi jus jambu biji merah sebesar 5%, 10%, dan 15% nyata meningkatkan kadar vitamin C set yogurt susu sapi. Kadar vitamin C set yogurt susu sapi memiliki pola garis linier dengan persamaan $y = 1,2932x - 0,324$ ($R^2 = 0,9452$).

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9452 menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi jus jambu biji merah dalam mempengaruhi kadar vitamin C pada set yogurt susu sapi sebesar 96%. Hal ini

menunjukkan konsentrasi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah 0% hingga 15% berpengaruh nyata terhadap kadar vitamin C.

Penambahan konsentrasi jus jambu biji merah 0% (P0) tidak terdeteksi adanya kandungan vitamin C (0,00 mg/100g) walaupun menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (2018), susu sapi segar mengandung kadar vitamin C sebesar 1 mg/100g, diperkirakan karena susu sapi segar selama pasteurisasi, kandungan vitamin C rusak akibat pemanasan. Menurut Sofro (1992), vitamin C sangat stabil pada pH 4-6 dan vitamin C mudah teroksidasi di udara, serta sensitif dan mudah rusak terhadap panas. Agar vitamin C tidak mudah rusak dan tetap bersifat stabil maka perlu penyimpanan dalam suhu dingin.

Gambar 2. Grafik *Polynomial Orthogonal* Pengaruh Penambahan Jus Jambu Biji Merah terhadap Kadar Vitamin C Set Yogurt Susu Sapi.

Jambu biji memiliki kadar vitamin C yang tinggi yaitu 86 mg/100g (Rukmana & Rahmat, 1996). Peningkatan kadar vitamin C pada Gambar 2. disebabkan karena konsentrasi penambahan jus jambu biji merah maka kandungan vitamin C semakin tinggi. Selain itu, pada pembuatan *set* yogurt susu sapi ini dilakukan proses penyimpanan dingin sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan vitamin C, yang merupakan salah satu zat antioksidan (Padang & Rasnita, 2017).

c. Aroma *Set* Yogurt Susu Sapi.

Tabel 2. menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah, nyata meningkatkan nilai kesukaan berdasarkan aroma *set* yogurt susu sapi. Nilai rata-rata tertinggi berdasarkan skala numerik adalah pada perlakuan penambahan konsentrasi jus jambu merah biji 15% (P3) yaitu 2,40 (suka-agak suka). Hal ini disebabkan semakin tinggi konsentrasi jus jambu biji merah semakin tercium aroma jambu dan mempengaruhi kesukaan terhadap aroma *set* yogurt. Tanggapan terhadap sifat sensori bau atau aroma biasanya diasosiasikan dengan aroma produk atau senyawa tertentu yang sudah umum dikenal dan penciuman bau atau aroma dapat dilakukan secara langsung (Setyaningsih *et al.*, 2010).

d. Rasa *Set* Yogurt Susu Sapi.

Tabel 2. menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah, nyata meningkatkan nilai kesukaan berdasarkan rasa *set* yogurt susu sapi. Nilai rata-rata tertinggi berdasarkan skala numerik adalah pada perlakuan penambahan konsentrasi jus jambu merah biji tertinggi yaitu 15% (P3) 2,24 (suka-agak suka). Perlakuan penambahan konsentrasi jus jambu biji merah 15% (P3) sangat disukai oleh panelis dibandingkan dengan perlakuan lainnya karena dipengaruhi oleh rasa manis yang dihasilkan. Menurut Azizah, *et al.* (2013), penambahan ekstrak buah nangka berdampak pada jumlah gula yang ditambahkan dalam yogurt *drink* sehingga menimbulkan dampak cita rasa manis yang semakin kuat. Kandungan gula mempengaruhi penilaian panelis terhadap citarasa. Rasa gula yang manis memiliki efek yang besar pada penilaian konsumen terhadap citarasa yogurt (Drake *et al.*, 2001).

e. Warna *Set* Yogurt Susu Sapi

Tabel 2. menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi jus jambu biji merah nyata berpengaruh meningkatkan nilai kesukaan berdasarkan warna *set* yogurt susu sapi yang dihasilkan.

Tabel 2. Nilai Akseptabilitas Berbagai Perlakuan

Peubah	Rata-rata Berbagai Perlakuan			
	P0	P1	P2	P3
Aroma	3,32 ^a	3,08 ^{ab}	2,80 ^b	2,40 ^c
Rasa	4,16 ^a	3,88 ^a	2,84 ^b	2,24 ^c
Warna	3,48 ^a	3,60 ^a	3,20 ^{ab}	2,40 ^b
Penampakan	3,40 ^a	3,68 ^a	2,84 ^b	2,44 ^c
Total Penerimaan	3,24 ^a	3,36 ^a	2,60 ^b	2,20 ^c

Keterangan: Huruf yang berbeda ke arah baris pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata.

Nilai rata-rata penerimaan panelis berdasarkan skala numerik adalah pada perlakuan penambahan konsentrasi jus jambu merah biji 15% (P3) yaitu 2,40 (suka-agak suka) dan seiring menurunnya penambahan konsentrasi jus jambu biji merah akan mengurangi tingkat kesukaan panelis. Warna merupakan parameter pertama yang menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap suatu produk, walaupun warna kurang berhubungan dengan nilai gizi, namun faktor warna tampil lebih dahulu dan tidak jarang sangat menentukan kesukaan (Netty & Methatias, 2015).

Perlakuan penambahan konsentrasi jus jambu biji merah 15% (P3) memberikan warna yang disukai yaitu merah khas jambu biji. Menurut Soewarno (1990), diantara sifat-sifat produk pangan yang paling menarik perhatian pada konsumen dan paling cepat pula memberikan kesan disukai atau tidak adalah sifat warna. Menurut Jimenez, *et al.* (2001) dan Yan, *et al.* (2006), khusus jambu biji merah mengandung beta karoten yang membuat warna merah dari jambu semakin jelas.

f. Penampakan *Set* Yogurt Susu Sapi

Tabel 2. menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah, nyata meningkatkan nilai kesukaan berdasarkan penampakan *set* yogurt susu sapi. Perlakuan penambahan konsentrasi jus jambu merah biji 15% (P3) yaitu 2,44 (suka-agak suka) selanjutnya menurun dengan berkurangnya konsentrasi berturut-turut. Hal yang berpengaruh terhadap penampakan yogurt adalah kadar bahan kering bahan baku. Kadar bahan kering jambu biji merah pada penelitian ini sebesar 13,01% dan berperan penting dalam pembentukan penampakan *set* yogurt yang padat. Menurut Jimenez *et al.* (2001) dan Yan *et al.* (2006), jambu biji merah mengandung bahan kering 13-26%.

Oleh karena itu, semakin tinggi penambahan konsentrasi jus jambu biji merah maka penampakan *set* yogurt akan semakin padat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chairunnisa (2007), hal lain yang berpengaruh terhadap penampakan yogurt adalah kadar bahan kering bahan baku, yang berperan penting dalam pembentukan penampakan *set* yogurt yang padat.

g. Total Penerimaan *Set* Yogurt Susu Sapi

Tabel 2. menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi jus jambu biji merah mempengaruhi total penerimaan *set* yogurt susu sapi yang dihasilkan. Nilai rata-rata tertinggi berdasarkan skala numerik adalah pada perlakuan penambahan konsentrasi jus jambu merah biji 15% (P3) yaitu 2,20 (suka-agak suka) selanjutnya menurun dengan berkurangnya konsentrasi penambahan. Total penerimaan merupakan penilaian terhadap semua *set* yogurt yang meliputi aroma, rasa, warna, dan penampakan secara subjektif dari produk yang dihasilkan dimana bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis. Perlakuan penambahan jus jambu biji merah 15% (P3), menghasilkan nilai skala numerik yang paling disukai karena memiliki aroma yang tidak terlalu berbau susu serta lebih tercium aroma khas jambu. Rasa yang paling manis dibandingkan dengan perlakuan lain, warna lebih sesuai (mendekati merah jus jambu), serta penampakan lebih padat.

KESIMPULAN

Penambahan konsentrasi jus jambu biji merah sebanyak 15% (*Psidium guajava* L.) memberikan pengaruh nyata menurunkan kadar asam laktat (0,55%), dan meningkatkan kadar vitamin C (20,69 mg/100g), serta nilai akseptabilitas *set* yogurt susu sapi yang paling disukai (2,20).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A., S. Kumaji, & F. Duengo. (2018). Pengaruh Penambahan Susu Sapi Terhadap Kadar Asam Laktat Pada Pembuatan Yoghurt Jagung Manis oleh *Streptococcus Thermophilus* dan *Lactobacillus Bulgaricus*. *Bioma: Jurnal Biologi*, 3(2):1-9.
- Agustina, T. (2016). *Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan Susu*. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Azizah, N., Pramono, Y. B., & Abduh, S. B. M. (2013). Sifat Fisik, Organoleptik, dan Kesukaan Yoghurt Drink dengan Penambahan Ekstrak Buah Nangka. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 2(3):148-155.
- Badan Standarisasi Nasional. (2009). *Yoghurt (SNI 2981:2009)*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI. (2018). *Daftar Komposisi Bahan Makanan*. <http://www.pangan.ku.org/id-ID/view>
- Drake, M. A., Gerard, P. D., & Chen, Q. (2001). Effects of Sweetener, Sweetener Concentration, and Fruit Flavor on Sensory Properties of Soy Fortified Yogurt. *Journal of Sensory Studies*, 16(4): 393-405.
- Gianti, I. & Evanuarini, H. (2011). Pengaruh Penambahan Gula dan Lama Penyimpanan Terhadap Kualitas Fisik Susu Fermentasi. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak*, 6(1):26-33.
- Chairunnisa, H. (2007). *The Chemical Characteristic and Acceptability of Set Yogurt Made from Caprine-Milk as Fermented Health Drink*. Seminar Nasional PATPI Bandung 2007. Fakultas Peternakan Universitas Padjajaran, Sumedang. 522.
- Chairunnisa, H. (2011). Pemilihan Proses Pembuatan Sari Buah Jambu Biji (*Psidium guajava* L.) untuk Meningkatkan Ketahanan Waktu Saji. *Widyatama*, 20(2): 123-130.
- Chairunnisa, H., Balia, R. L., Pratama, A., & Dadan, H. R. (2017). Karakteristik Kimia Set Yoghurt dengan Bahan Baku Susu Tepung dengan Penambahan Jus Bit (*Beta Vulgaris* L.). *Jurnal Ilmu Ternak*, 17(1):35-39.
- Jimenez-Escrig, A., Rincom, M., Pulido, R., & Saura-Calixto, F. (2001). Guava Fruit (*Psidium Guajava* L.) as a New Source of Antioxidant Dietary Fiber. *J. Agr. Food Chem*, 49:5489-5493.
- Khasanah, R. N., Tjahjadi, P. & Ari, S. (2015). Vitamin C Content in Yogurt with the Addition of Tawangmangu Tangerine Juice (*Citrus nobilis* var. Tawangmangu). *Nusantara Bioscience*, 7(2):149-152.
- Lourens-Hattingh, A., & Viljoen, B. C. (2001). Yoghurt as Probiotic Carrier Food. *International Dairy Journal*, 11: 1-17
- Lyo-San Inc. (2015). Step-by-Step How to Make Your Own Yoghurt. <http://www.yogourmet.com>
- Netty, H., & Methatias, B. C. (2015). Kajian Variasi Konsentrasi Sukrosa terhadap Karakteristik Nata Timun Suri (*Cucumis Sativus* L.). *Jurnal AGRITEPA*, 2(1):89-104.

- Padang, S. A., & Rasnita, M. M. (2017). Penetapan Kadar Vitamin C pada Buah Jambu Biji Merah (*Psidium guajava* L.) dengan Metode Titrasi NA-2,6 Dichlorophenol Indophenol (DCIP). *Media Farmasi*, 13(2).
- Patil, A. P., Chavan, K. D., & Bhosale, D. N. (2009). Influence of Addition of Guava Pulp and Sugar on Sensory Quality of Guava Yoghurt. *J. Dairying, Foods & H.S*, 28(2):95-100.
- Rahman, A. S., Fardiaz, W., Rahayu, P., Suliantari, & Nurwitri, C. C. (1992). *Teknologi Pengolahan Susu*. Depdikbud Dirjen PT Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB: Bogor.
- Rukmana & Rahmat. (1996). *Jambu Biji*. Kanisius: Yogyakarta.
- Setyaningsih, D., Apriyantono, A., & Sari, M. P. (2010). *Analisis Sensori untuk Industri Pangan dan Agro*. IPB Press: Bogor. 180.
- Soewarno, S. (1990). *Dasar-dasar pengawasan dan standarisasi mutu pangan*. IPB Press: Bogor.
- Sofro, A. S. (1992). Protein Vitamin dan Bahan Ikatan Pangan. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Yan, L. Y., Ten, L. T., & Jhi, T. J. (2006). Antioxidant Properties of Guava Fruit: Comparison with Some Fruit. *J. Sunway Academic*, 3:9-20.
- Yusmarini & Efendi, R. (2004). Evaluasi Mutu Soygurt yang dibuat dengan Penambahan Beberapa Jenis Gula. *Jurnal Natur Indonesia*, 6:104-110.